

Cas suspect de rougeole

- ★ Toute personne présentant une éruption généralisée avec de la fièvre, plus un des éléments suivants : toux ou coryza (nez qui coule) ou conjonctivite (yeux rouges)
- ★ Toute personne chez qui un clinicien suspecte la rougeole.

Comment améliorer la détection des cas suspects de rougeole ?

1. Chaque semaine effectuer une recherche active des cas de rougeole

- ★ Dans votre centre de santé
- ★ Dans les hôpitaux publics et privés
- ★ Chez les tradithérapeutes

2. Sensibiliser les cliniciens, les tradithérapeutes, pour la détection rapide des cas de rougeole

3. Sensibiliser la communauté, les tradithérapeutes afin que les services de santé soit informé si quelqu'un a une fièvre et une éruption



Que faire dès qu'on détecte un cas suspect de rougeole ?

1. Notifier le cas par RAC, téléphone ou tout autre moyen de communication

2. Prélever dans les 30 premiers jours qui suivent le début de l'éruption ;

★ Prélever 5 ml de sang par ponction veineuse dans un tube sec et stérile ;

★ Laisser reposer le sang pendant au moins 1 heure ou bien

- Mettre l'échantillon dans un réfrigérateur pendant 4 à 6 heures jusqu'à ce que le caillot se rétracte (si un réfrigérateur est disponible) ou bien

- Laisser reposer le sang pendant 30-60 minutes, ensuite centrifuger le prélèvement à 2000 tours/mn, pendant 10-20 minutes (si une centrifugeuse est disponible)

★ Puis, transvaser ensuite le sérum dans un tube de verre propre

3. Remplir entièrement le formulaire d'investigation des cas

4. Mettre le prélèvement étiqueté dans un porte vaccin avec des accumulateurs congelés

5. Acheminer le porte vaccin, le prélèvement et le formulaire d'investigation bien rempli par le transporteur agréé selon les directives données

Quels sont les principaux indicateurs de performance de la surveillance des cas de rougeole ?

1. Le pourcentage de cas suspects de rougeole notifiés avec prélèvement de sang

☞ **Cible : = au moins 80%**

2. Le pourcentage de districts ayant notifié dans l'année au moins un cas suspect de rougeole avec prélèvement effectué (ou ayant notifié au moins 1 cas pour 100.000 habitants)

☞ **Cible : = au moins 80%**

NB : Tous les cas suspects de rougeole doivent faire l'objet d'un prélèvement de sang ; mais lors d'une flambée épidémique suspecte de rougeole les prélèvements sont limités à 5 cas et les prélèvements sont acheminés exactement comme pour les vaccins (entre +2°C et + 8°C).